

ПЕРИОДИЧЕСКО
СПИСАНИЕ

НА

ВЪЛГАРСКОТО КНИЖОВНО ДРУЖЕСТВО

ВЪ СОФИЯ

LXX

(ГОДИШНИНА XX)

— 1909. —



ПЛОВДИВЪ
ПЕЧАТНИЦА НА ХР. Г. ДАНОВЪ
1909

Пеперудитѣ отъ Битолската околностъ.

Съобщава А. Димитровъ.

Прѣдставилъ Ст. Юриничъ.

Въ една друга статия азъ давамъ материяли по фауната на Европейска Турция, и то специално по птицитѣ. Нѣколко годишното ми стоение въ Битоля, като учителъ при мъжката гимназия, даде ми възможностъ, да простра изучването си и върху ентомологическата фауна. Започнахъ отъ пеперудитѣ, на които посветихъ миналата 1907 и текущата 1908 години. Колкото за другитѣ разреди, тѣ ще чакатъ своя редъ и ще бждатъ обнародвани, по всѣка вѣроятностъ, пакъ въ страницитѣ на Периодическото списание.

Градъ Битоля, както съмъ вече казалъ и другадѣ, лежи 618 мм. надъ морската височина и въ западната частъ на Пелагонийската равнина. дълга около 60 км. и широка около 15 км. Равнината е заградена отъ всѣкждѣ съ планини, а именно отъ западъ съ Пелистеръ, Баба пл. и Неречка пл., отъ изтокъ съ Селечка планина и Малка Нидже, отъ сѣверъ съ Крушовска пл. и Бабуна пл. и отъ югъ съ низката Нѣвеска планина. На сѣверо-изтокъ се намира Плетварскиятъ проходъ, на сѣверо-западъ—проходъ Гявато, на югъ—Владовскиятъ и на юго-изтокъ—Бабчорскиятъ и Песодерскиятъ. Отъ сѣверъ къмъ югъ прѣзъ равнината тече р. Черна, най-голѣмиятъ притокъ на р. Вардаръ.

Пеперуди азъ ловихъ най-вече покрай рѣката при с. Кръстофоръ, което е заселено въ подножието на пл. Пелистеръ, около 4 км. южно отъ Битоля. Отъ дърветата, които се срѣщатъ тука, заслужватъ споменвание: джбъ, елха, брѣстъ, топола, върба, орѣхъ, черница, слива, птичи дрѣнъ, бжзове и пр. Второ мѣсто е с. Смолево, заселено сжщо въ подножието на пл. Пелистеръ, юго-западно отъ Битоля около 2 км. Отъ дърветата тука се срѣщатъ: джбъ, брѣстъ, топола, върба, плодови дървета, като кестенъ, черѣша, слива, черница, дрѣнъ и пр. и храстѣ като шипка, хвойна, габъръ, птичи дрѣнъ, пѣтльови

нокти, люлякъ и пр. Трето мѣсто, но по-малко изобилно съ пеперуди, сж нивитѣ и ливадитѣ около р. Драгоръ подъ Битоля. Тука изобилватъ най-вече върби, тополи и тукъ-тамъ елхи. Освѣнъ това въ списъка споменавамъ още и Кисела вода, минераленъ изворъ съ въгленна киселина и желѣзенъ хидратъ, далечъ около 5 км. южно отъ Битоля.

Максималната температура на въздуха на сѣнка въ Битоля достига обикновено до 35 градуса, а минималната—до 15 градуса.

Всички пеперуди, събрани отъ менъ въ околността на Битоля, възлизатъ на 139 вида, а именно: *Rhopalocera* съ 63 вида, *Spinges* съ 12 вида, *Bom yces* съ 14 вида, *Noctuae* съ 26 вида и *Geometrae* съ 24 вида.

При изучаването на материалитѣ ползувахъ се отъ слѣдната литература по пеперудитѣ: 1) *Atlas colorié des papillons d'Europe et* 2) *Lepidoptères de la France* отъ F. Berge; 3) Приносъ къмъ изучаването на пеперудитѣ въ София и околността ѝ отъ П. Бахметьевъ (Годишникъ на бѣлг. природоизп. д-во, II год., № 3); 4) Материяли по фауната на Русенската околностъ отъ В. Т. Ковачевъ (Год. на бѣлг. природоизп. д-во, II год., № 3) и пр.

Rhopalocera.

Papilio podalirius L. Има двѣ генерации, отъ които първата се явява прѣзъ май, а втората прѣзъ юли. Срѣща се край рѣката при с. Кръстофоръ, въ околността на с. Смолево, по нивитѣ и ливадитѣ около р. Драгоръ и въ града Битоля. Доста обикновена форма.

Thaïs cerisyi God. Прѣзъ юни. Край рѣката при с. Кръстофоръ и въ околноститѣ на с. Смолево. Доста обикновена.

Thaïs polyxena Schiff. Прѣзъ априлъ и май. Край рѣката при с. Кръстофоръ и въ околността на с. Смолево. Доста обикновена.

Aporia crataegi L. Прѣзъ априлъ, май и юни. Край рѣката при с. Кръстофоръ, въ околноститѣ на с. Смолево, по нивитѣ и ливадитѣ около р. Драгоръ и въ г. Битоля. Появява се въ необикновено голѣмо количество.

Pieris daphidice L. Първа генерация прѣзъ Априлъ и май, втора прѣзъ августъ и септември. Край рѣката при с. Кръсто-

форъ и по ливадитѣ около р. Драгоръ подѣ Битоля. Доста обикновена.

Pieris rapae L. Първа генерация прѣзъ май и юни, втора прѣзъ августъ. Край рѣката при с. Кръстофоръ и по ливадитѣ около Драгоръ подѣ Битоля.

Pieris napi L. Първа генерация прѣзъ мартъ, априлъ и май, втора прѣзъ августъ и септември. По ливадитѣ около Драгоръ подѣ Битоля. Доста обикновена.

Euchloë belia Gr. Първа генерация прѣзъ мартъ и априлъ, втора прѣзъ юни. Край рѣката при с. Кръстофоръ. Доста обикновена.

Leptidia sinapis L. Първа генерация прѣзъ априлъ и май, втора прѣзъ юли и августъ. Край рѣката при с. Кръстофоръ и въ околността на Кисела вода. Твърдѣ обикновена.

Colias edusa Fabr. Първа генерация прѣзъ априлъ и май, втора прѣзъ августъ и септември. Край рѣката при с. Кръстофоръ, въ околността на с. Смолево и по ливадитѣ около р. Драгоръ подѣ Битоля. Твърдѣ обикновена.

Gonopterix rhamni L. Срѣща се прѣзъ юли и августъ, слѣдъ това прѣзимува и се появява отново на пролѣтъ. Край рѣката при с. Кръстофоръ. Не особено разпространена.

Thecla spini Schiff. Прѣзъ юни и юли. Край рѣката при с. Кръстофоръ и въ околноститѣ на с. Смолево. Твърдѣ обикновена.

Zephyrus quercus L. Прѣзъ юни и юли. Край рѣката при с. Кръстофоръ. Много рѣдка форма.

Chrysophanus virgaureae L. Прѣзъ юли и августъ. Край рѣката при с. Кръстофоръ, при Кисела вода и по ливадитѣ около р. Драгоръ подѣ Битоля. Доста обикновена.

Chrysophanus thersamon Esp. Прѣзъ юли и августъ. Край рѣката при с. Кръстофоръ и по ливадитѣ около р. Драгоръ подѣ Битоля. Доста обикновена.

Chrysophanus dispar Haw. Прѣзъ юни и юли. Край рѣката при с. Кръстофоръ и по ливадитѣ около р. Драгоръ подѣ Битоля. Доста обикновена.

Chrysophanus hippothoë L. Прѣзъ юни и юли. Въ околността на с. Смолево. Доста обикновена.

Chrysophanus alciphron Rott. Прѣзъ май, юни и юли. Край рѣката при с. Кръстофоръ. Доста обикновена.

Chrysophanus dorylas Hufn. Първа генерация прѣзъ май, втора прѣзъ юли и августъ. Край рѣката при с. Кръстофоръ и по ливадитѣ около Кисела вода. Твърдѣ обикновена.

Chrysophanus phlaeas L. Първа генерация прѣзъ май, втора прѣзъ юли, августъ и септември. Край рѣката при с. Кръстофоръ и по ливадитѣ около р. Драгоръ подъ Битоля. Твърдѣ обикновена.

Lycaena argus L. Прѣзъ май, юни, юли и августъ (двѣ генерации). Край рѣката при с. Кръстофоръ.

Lycaena astrarche Bergstr. Първа генерация прѣзъ априлъ и май, втора прѣзъ августъ и септември. Край рѣката при с. Кръстофоръ и въ околността на кисела вода.

Lycaena icarus Rott. Прѣзъ май, юни, юли и августъ. Край рѣката при с. Кръстофоръ и по ливадитѣ около р. Драгоръ подъ Битоля.

Lycaena bellargus Rott. Първа генерация прѣзъ май и юни, втора прѣзъ юли и августъ. Край рѣката при с. Кръстофоръ.

Lycaena damon Schiff. Прѣзъ юни и юли. Край рѣката при с. Кръстофоръ.

Apatura ilia Schiff. Прѣзъ юни и юли. Край рѣката при с. Кръстофоръ. Не твърдѣ разпространена.

Libythea celtis Esp. Прѣзъ юни и юли. Край рѣката при с. Кръстофоръ. Уловихъ само единъ екземпляръ.

Limenitis camilla Schiff. Прѣзъ юни и юли. Край рѣката при с. Кръстофоръ и въ околноститѣ на с. Смолево. Доста обикновена.

Polygonia C. album L. Първа генерация прѣзъ май и юни, втора прѣзъ августъ и септември. Край рѣката при с. Кръстофоръ и по ливадитѣ около р. Драгоръ подъ Битоля. Не твърдѣ рѣдка.

Vanessa urticae L. Срѣща се прѣзъ цѣлата година. Край рѣката при с. Кръстофоръ и по ливадитѣ около р. Драгоръ подъ Битоля. Не твърдѣ рѣдка.

Vanessa polychloros L. Отъ юли до априлъ. Край рѣката при с. Кръстофоръ и въ околноститѣ на с. Смолево.

Vanessa io L. Отъ юли до априлъ. Край рѣката при с. Кръстофоръ и по ливадитѣ около р. Драгоръ подъ Битоля. Доста рѣдка.

Vanessa antiopa L. Отъ юли до априли. Край рѣката при с. Кръстофоръ и по ливадитѣ около р. Драгоръ подъ Битоля. Твърдѣ рѣдка.

Pyrameis atalanta L. Прѣзъ юли, августъ и септември. Край рѣката при с. Кръстофоръ и по ливадитѣ около р. Драгоръ подъ Битоля. Твърдѣ рѣдка.

Pyrameis cardui L. Отъ юли до май. Всѣкждѣ въ околноститѣ на Битоля и въ доста голѣмо количество.

Melitaea cinxia L. Прѣзъ май и юни. Въ околноститѣ на с. Смолево. Доста обикновена.

Melitaea phoebe Knosch. Прѣзъ юли. Край рѣката при с. Кръстофоръ и по ливадитѣ около р. Драгоръ подъ Битоля. Доста обикновена.

Melitaea didyma Ochs. Прѣзъ юни и юли. Край рѣката при с. Кръстофоръ. Доста обикновена.

Melitaea athalia Rott. Прѣзъ май, юни и юли. Край рѣката при с. Кръстофоръ. Доста обикновена.

Argynnis daphne Schiff. Прѣзъ юли и августъ. Край рѣката при с. Кръстофоръ и въ околноститѣ на с. Смолево. Твърдѣ обикновена.

Argynnis aglaja L. Прѣзъ юни и юли. Край рѣката при с. Кръстофоръ. Доста обикновена.

Argynnis raphia L. Прѣзъ юни и юли. Край рѣката при с. Кръстофоръ. Твърдѣ обикновена.

Argynnis pandora Schiff. Прѣзъ юни, юли и августъ. Край рѣката при с. Кръстофоръ. Твърдѣ обикновена.

Melanargia Galathea L. Прѣзъ юли и августъ. Край рѣката при с. Кръстофоръ и въ околноститѣ на с. Смолево. Твърдѣ обикновена.

Satyrus statilinus Hufn. Прѣзъ юни и юли. Край рѣката при с. Кръстофоръ и въ околноститѣ на с. Смолево. Доста обикновена.

Pararge roxelana Gr. Прѣзъ юни и юли. Край рѣката при с. Кръстофоръ и въ околността на с. Смолево. Не твърдѣ обикновена.

Pararge maera L. Прѣзъ май, юни, юли и августъ. Край рѣката при с. Кръстофоръ, въ околността на Кисела вода и по ливадитѣ около р. Драгоръ подъ Битоля. Доста обикновена.

Pararge megaera L. Първа генерация прѣзъ май и юни, втора прѣзъ юли и августъ. Край рѣката при с. Кръстофоръ и по ливадитѣ около р. Драгоръ подъ Битоля. Доста обикновена.

Pararge aegeria L. Първа генерация прѣзъ априлъ, май и юни, втора прѣзъ августъ и септември. Край рѣката при с.

Кръстофоръ и по ливадитѣ около р. Драгоръ подѣ Битоля. Доста рѣдка.

Epinephele lycaon Rott. Прѣзъ юни и юли. Край рѣката при с. Кръстофоръ.

Epinephele jurtina L. Прѣзъ юни и юли. Край рѣката при с. Кръстофоръ и въ околността на с. Смолево. Доста обикновена.

Epinephele tithonus L. Прѣзъ юли и августъ. Край рѣката при с. Кръстофоръ.

Aphantopus hyperanthus L. Прѣзъ юни и юли. Край рѣката при с. Кръстофоръ. Твърдѣ рѣдка.

Coenonympha arcania L. Прѣзъ юни и юли. Край рѣката при с. Кръстофоръ.

Coenonympha pamphilus L. Прѣзъ априлъ, май, юни, юли, августъ и септември. Край рѣката при с. Кръстофоръ, въ околноститѣ на с. Смолево и по ливадитѣ подѣ Битоля. Твърдѣ обикновенъ видъ.

Carcharodus alceae Esp. Първа генерация прѣзъ априлъ и май, втора прѣзъ юли и августъ. Въ околноститѣ на Кисела вода и по ливадитѣ около р. Драгоръ подѣ Битоля. Доста обикновена.

Carcharodus altheae Hübn. Прѣзъ май, юни и юли. Край рѣката при с. Кръстофоръ.

Hesperia malvae L. Първа генерация прѣзъ априлъ и май, втора прѣзъ августъ и септември. Край рѣката при с. Кръстофоръ. Обикновенъ видъ.

Thanaos tages L. Първа генерация прѣзъ априлъ и май, втора прѣзъ юни и юли. Въ околността на Кисела вода.

Atopaea thaumas Hufn. Прѣзъ юни и юли. Край рѣката при с. Кръстофоръ. Доста обикновена.

Augiades Sylvanus Esp. Прѣзъ юни и юлий. Край рѣката при с. Кръстофоръ, въ околноститѣ на с. Смолево и по ливадитѣ около р. Драгоръ подѣ Битоля. Твърдѣ обикновенъ видъ.

Augiades comma L. Прѣзъ юни и юли. Край рѣката при с. Кръстофоръ. Доста обикновена.

Cyclopides morpheus Pall. Прѣзъ май и юни. Край рѣката при с. Кръстофоръ. Твърдѣ рѣдка.

Heterocera.

Sphinges.

Protoparce convolvuli L. Първа генерация прѣзъ юни, втора прѣзъ августъ и септември. Намира се въ Битоля, но много рѣдко.

Macroglossa stellatarum L. Прѣзъ май, юни, юли, августъ и септември. Край рѣката при с. Кръстофоръ, въ околността на с. Смолево и по ливадитѣ ооко р. Драгоръ подъ Битоля. Доста обикновена.

Sciapteron tabaniforme Rott. Прѣзъ май и юни. Въ околноститѣ на с. Смолево. Уловихъ само единъ екземпляръ, понеже е много рѣдка.

Sesia tipuliformes Cl. Прѣзъ май и юни. Край рѣката при с. Кръстофоръ. Доста обикновена.

Sesia conopiformes Esp. Прѣзъ май, юни и юли. Край рѣката при с. Кръстофоръ.

Thyris fenestrella Scop. Прѣзъ май и юни. Край рѣката при с. Кръстофоръ. Обикновенъ видъ.

Ino globulariae Hüb. Прѣзъ май и юни. Край рѣката при с. Кръстофоръ, въ околноститѣ на с. Смолево и по ливадитѣ ооко р. Драгоръ подъ Битоля. Твърдѣ обикновена.

Zygaena pilosellae Esp. Прѣзъ юни и юли. Край рѣката при с. Кръстофоръ. Доста обикновена.

Zygaena lonicerae Esp. Прѣзъ юни и юли. Край рѣката при с. Кръстофоръ. Обикновенъ видъ.

Zygaena filipendulae L. Прѣзъ юни и юли. Край рѣката при с. Кръстофоръ. Доста обикновена.

Zygaena ephialtes L. Прѣзъ юли и августъ. Край рѣката при с. Кръстофоръ. Обикновенъ видъ.

Syntomis phegea L. Прѣзъ юни и юли. Край рѣката при с. Кръстофоръ и въ околността на с. Смолево. Твърдѣ разпространена и обикновена.

Coscinia striata L. Прѣзъ юни, юли и августъ. Край рѣката при с. Кръстофоръ и по ливадитѣ ооко р. Драгоръ подъ Битоля. Доста обикновенъ видъ.

Hipocrita jacobaeae L. Прѣзъ май и юни. Край рѣката при с. Кръстофоръ. Не твърдѣ рѣдка.

Callimorpha 4-punctata. Poda (Hera L.) Прѣзъ юли и августъ. Край рѣката при с. Кръстофоръ. Не твърдѣ рѣдка.

Arctia villica L. Прѣзъ юни и юли. Край рѣката при с. Кръстофоръ и при желѣзнопѣтната станция подѣ Битоля. Не твърдѣ обикновена.

Khyparia purpurata L. Прѣзъ юни и юли. Край рѣката при с. Кръстофоръ. Уловихъ само единъ екземпляръ понеже е много рѣдка.

Phragmatobia fuliginosa L. Първа генерация прѣзъ май и юни, втора прѣзъ юли и августъ, слѣдъ това прѣзимува и прѣзъ априлъ отново се появява. Срѣща се въ града Битоля.

Spilosoma menthastri Esp. Прѣзъ априлъ, май, юни и юли. По нивитѣ около р. Драгоръ подѣ Битоля. Много рѣдко, намѣрихъ само единъ екземпляръ.

Stilpnotia salicis L. Прѣзъ юни, юли и августъ. По нивитѣ и ливадитѣ около р. Драгоръ подѣ Битоля. Срѣща се обикновено по върбитѣ и тополитѣ въ доста голѣмо количество.

Enproctis chrysorrhoea L. Прѣзъ юни и юли. Край рѣката при с. Кръстофоръ, въ околността на с. Смолево и покрай р. Драгоръ подѣ Битоля. Много разпространенъ и обикновенъ видъ.

Humantria dispar L. Прѣзъ юли и августъ. Край рѣката при с. Кръстофоръ, въ околността на с. Смолево, край р. Драгоръ по нивитѣ и ливадитѣ и въ самия градъ Битоля. Появява се въ голѣмо количество.

Malacosoma neustria L. Прѣзъ юни и юли. По кѣшитѣ въ града Битоля.

Saturnia pyri Schiff. Прѣзъ априлъ и май. Срѣща се въ града Битоля и околността му. Доста обикновена.

Phalera bucephala L. Прѣзъ май и юни. По нивитѣ и ливадитѣ въ полето подѣ Битоля. Уловихъ само единъ екземпляръ.

Pugnaea pigra Hufn. Първа генерация прѣзъ май и юни, втора прѣзъ августъ и септември. Край рѣката при с. Кръстофоръ.

Acronycta psi L. Прѣзъ априлъ, май, юни и юли. Край рѣката при с. Кръстофоръ. Доста рѣдко.

Agrotis exclamationis L. Прѣзъ май и юни. По кѣшитѣ въ града Битоля.

Agrotis ypsilon Rott. Прѣзъ юни, юли, августъ и септември. Край рѣката при с. Кръстофоръ. Много рѣдко, уловихъ само единъ екземпляръ.

Trachea atriplicis L. Прѣзъ май, юни, юли, августъ и септември. Край рѣката при с. Кръстофоръ.

Brotolamia meticulosa L. Прѣзъ априлъ, май, юни, юли, августъ и септември. По нивитѣ и ливадитѣ около р. Драгоръ подъ Битоля. Уловихъ само единъ екземпляръ.

Caradrina alsines Brahm. Прѣзъ юни, юли и августъ. Край рѣката при с. Кръстофоръ.

Calymnia affinis L. Прѣзъ юли и августъ. Край рѣката при с. Кръстофоръ и по ливадитѣ около р. Драгоръ подъ Битоля. Доста рѣдка

Plastenis retusa L. Прѣзъ юни и юли. Край рѣката при с. Кръстофоръ.

Scoliopteryx libatrix L. Отъ юни до мартъ. Край р. Драгоръ подъ града Битоля. Много рѣдка, уловихъ само единъ екземпляръ.

Plusia gamma L. Срѣща се почти прѣзъ цѣлата година. Край рѣката при с. Кръстофоръ, по ливадитѣ около Кисела вода и по ливадитѣ около р. Драгоръ подъ Битоля. Доста обикновенъ видъ.

Anarta cordigera Thunb. Прѣзъ май и юни. Край рѣката при с. Кръстофоръ. Много рѣдка, уловихъ само единъ екземпляръ.

Heliothis cardui Hübn. Прѣзъ май, юни и юли. По ливадитѣ около р. Драгоръ подъ Битоля.

Heliothis ononis Fabg. Прѣзъ май и юни. По ливадитѣ около р. Драгоръ подъ града Битоля. Не твърдѣ обикновена.

Heliothis peltigera Schiff. Прѣзъ май, юни, юли и августъ. Край рѣката при с. Кръстофоръ. Много рѣдко, уловихъ само единъ екземпляръ.

Acontia luctuosa Esp. Първа генерация прѣзъ май и юни, втора прѣзъ юли и августъ. По нивитѣ около р. Драгоръ подъ града Битоля. Не твърдѣ рѣдко.

Talpochares respersa Hübn. Първа генерация прѣзъ май и юни, втора прѣзъ юли и августъ. Край рѣката при с. Кръстофоръ.

Talpochares purpurina Hübn. Първа генерация прѣзъ май и юни, втора прѣзъ августъ и септември. По ливадитѣ около р. Драгоръ подъ Битоля. Обикновенъ видъ.

Emmelia frabealis Scop. Прѣзъ май, юни, юли и августъ. Край рѣката при с. Кръстофоръ. Доста обикновена.

Euclidia Mi. Сі. Първа генерация прѣзъ май и юни, втора прѣзъ юли и августъ (?). Въ околността на с. Смолево.

Euclidia glyphica L. Първа генерация прѣзъ априлъ и май, втора прѣзъ юли и августъ. Край рѣката при с. Смолево и по ливадитѣ около р. Драгоръ подъ Битоля. Твърдѣ обикновенъ видъ.

Grammodes algira L. Първа генерация прѣзъ май, втора прѣзъ юли и августъ. Край рѣката при с. Кръстофоръ. Не твърдѣ рѣдко.

Catocala elocata Esp. Прѣзъ юли и августъ. По кжшитѣ въ града Битоля. Твърдѣ разпространена.

Catocala sponsa L. Прѣзъ юли и августъ. Край рѣката при с. Кръстофоръ.

Catocala promissa Esp. Прѣзъ юли и августъ. Край рѣката при с. Кръстофоръ. Доста обикновенъ видъ.

Catocala paranymphe L. Прѣзъ юли и августъ. Край рѣката при с. Кръстофоръ.

Toxocampa Craccae Fabr. Прѣзъ юли и августъ. Край рѣката при с. Кръстофоръ. Много рѣдка, намѣрихъ само единъ екземпляръ.

Geometrae.

Euchloris smaragdaria Fabr. Първа генерация прѣзъ юни и юли, втора прѣзъ августъ и септември. Край рѣката при с. Кръстофоръ и по ливадитѣ около р. Драгоръ подъ Битоля. Не особено обикновена.

Thalera janbrialis Scop. Прѣзъ юли. Край рѣката при с. Кръстофоръ. Доста рѣдко.

Acidalia aversata L. Прѣзъ юни и юли. Край рѣката при с. Кръстофоръ. Обикновенъ видъ.

Acidalia ornata Scop. Първа генерация прѣзъ май и юни, втора прѣзъ юли и августъ. По нивитѣ и ливадитѣ около р. Драгоръ подъ града Битоля. Твърдѣ рѣдко.

Acidalia decorata Borkh. Първа генерация прѣзъ май и юни, втора прѣзъ юли и августъ. Край рѣката при с. Кръстофоръ и около р. Драгоръ подъ града Битоля. Доста обикновена.

Ephyra porata Fabr. Първа генерация прѣзъ априлъ и май, втора прѣзъ юли и августъ. Въ околноститѣ на с. Смолево и по ливадитѣ около Кисела вода.

Rhodostophia Vibicaria Cl. Първа генерация прѣзъ май и юни, втора прѣзъ юли и августъ. Край рѣката при с. Кръстофоръ. Не особено рѣдко.

Cabera exanthemaria Scop. Първа генерация прѣзъ априлъ, май и юни, втора прѣзъ августъ и септември. Въ околността на с. Смолево.

Ennomos erosaria Borkh. Първа генерация прѣзъ юни и юли, втора прѣзъ августъ и септември. Край рѣката при с. Кръстофоръ. Много рѣдко, уловихъ само единъ екземпляръ

Venilia Macularia L. Прѣзъ май и юни. Край рѣката при с. Кръстофоръ и въ околността на Кисела вода. Не особено рѣдко.

Eilicrinia cordiaria Hübn. Срѣща се само прѣзъ юли. По нивитѣ и ливадитѣ около р. Драгоръ подъ града Битоля. Много рѣдка, уловихъ само единъ екземпляръ.

Semiothisa alternaria Hübn. Първа генерация прѣзъ априлъ и май, втора прѣзъ юли и августъ. Край рѣката при с. Кръстофоръ. Много рѣдко, уловихъ само единъ екземпляръ.

Boarmia Gemmaria Brahm. Първа генерация прѣзъ май и юни втора прѣзъ юли и септември. Край рѣката при с. Кръстофоръ.

Boarmia secundaria Esp. Прѣзъ май, юни и юли. По ливадитѣ около р. Драгоръ подъ Битоля.

Ematurga atomaria L. Прѣзъ априлъ, май, юни и юли. Край рѣката при с. Кръстофоръ.

Scoria lineata Scop. Прѣзъ май и юни. Въ околността на с. Смолево. Много рѣдко, намѣрихъ само единъ екземпляръ.

Perconia Strigillaria Hübn. Първа генерация прѣзъ май и юни, втора прѣзъ юли и августъ. Въ околноститѣ на с. Смолево. Много рѣдко, намѣрихъ само единъ екземпляръ.

Lythria purpuraria L. Прѣзъ юли и августъ. Край рѣката при с. Кръстофоръ.

Anaitis plagiata L. Първа генерация прѣзъ май и юни, втора прѣзъ августъ и септември. Въ околността на с. Смолево и край рѣката при с. Кръстофоръ. Обикновенъ видъ.

Scotosia rhamnata Schiff. Прѣзъ юни и юли. Край рѣката при с. Кръстофоръ.

Larentia ocellata L. Първа генерация прѣзъ май и юни, втора прѣзъ юли и августъ. Край рѣката при с. Кръстофоръ.

Larentia unangulata HaW. Първа генерация прѣзъ май и юни, втора прѣзъ юли и августъ. По ливадитѣ около р. Драгоръ подъ Битоля. Доста обикновена.

Larentia bilineata L. Прѣзъ май, юни, юли и августъ. Край рѣката при с. Кръстофоръ, въ околността на с. Смолево и по нивитѣ около р. Драгоръ подъ Битоля. Твърдѣ разпространенъ и обикновенъ видъ.

Eupithecia venosata Fabr. Прѣзъ май и юни. По ливадитѣ около р. Драгоръ подъ Битоля.